

EL PROGRAMA DE MEJORA GENÉTICA DE *PINUS PINASTER* EN GALICIA

Zas, R.¹ ; Merlo, E.²

¹ Misión Biológica de Galicia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Apdo. 28, Pontevedra 36080.

² CIS-MADEIRA, Avda. Galicia, 5. San Cibrao das Viñas. Parque Tecnológico de Galicia 32901, Ourense.

Autores para la correspondencia: rzas@cesga.es ; emerlo@cismadeira.com

Boletín del CIDEU 6-7: 5-24 (2008)

ISSN 1885-5237

Resumen

El pino marítimo es una de las especies más importantes del sector forestal gallego. Fruto de esta importancia, desde los años 80 se lleva a cabo un programa de mejora cuyo fin último es el abastecimiento de semilla de alta calidad genética para su uso en repoblación. En este trabajo se revisan las actuaciones realizadas al respecto tanto en la zona costera como en el interior de Galicia. Se describe el dispositivo experimental del programa, los objetivos y la estrategia de mejora, los resultados más relevantes alcanzados hasta la fecha, así como la planificación de las actuaciones futuras. Aunque el programa se centra en caracteres clásicos como la productividad y la rectitud del fuste, se discuten también los resultados obtenidos y las posibilidades de mejora de otros caracteres de interés como la resistencia a patologías y plagas, la eficiencia nutricional o la calidad de madera.

Palabras clave: pino marítimo, heredabilidad, interacción genotipo × ambiente, correlación juvenil adulto, material forestal de reproducción, ensayos de progenie, huerto semillero

Summary

Genetic improvement of *Pinus pinaster* in Galicia (NW Spain)

Maritime pine is one the most important forest-tree species in Galicia. A breeding program was started in the 80's with the aim to provide genetic improved seed to be use in reforestation. In the present paper we review all the activities done to date, both in the coastal and interior area of Galicia, describing the experimental device, the breeding objectives and breeding strategy, presenting the main results achieved, and advancing further activities of the program. Although the breeding program was focused on classical traits such productivity and stem straightness, results and breeding possibilities of other traits such as pest and disease resistance, nutritional efficiency and wood quality are also discussed.

Keywords: maritime pine, heritability, genotype by environment interaction, juvenile mature correlation, reproductive forest material, quantitative genetics, progeny trials, seed orchard.

I. Introducción

El pino marítimo (*Pinus pinaster* Ait.) es una de las principales especies forestales del extremo suroccidental de Europa, ocupando importantes superficies en Francia, España, Portugal, Italia y norte de África. A su amplia distribución natural se añade un elevado interés para su uso en reforestación, tanto con fines de conservación ecológica (principalmente en la región mediterránea y arenales costeros), como productivo, siendo una especie fundamental en la producción de madera de sierra y trituración en la franja eurosiberiana del suroeste europeo. Su elevado potencial productivo, unido a una gran frugalidad y resistencia a la sequía, salinidad, y a plagas y enfermedades ha motivado su expansión como especie productiva a otros países como Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, donde ya ocupa más de 200.000 ha.

Hoy en día, *P. pinaster* es la especie arbórea más abundante en Galicia donde, no en vano, recibe los nombres vulgares de “piñeiro bravo” o “piñeiro do pais”. Actualmente ocupa en la región alrededor de 400.000 ha en masas puras y 200.000 ha en masas mixtas con eucalipto y roble, con un incremento anual de volumen cercano a los 3 millones de m³ (DGCN, 2002). En esta región, se distinguen dos procedencias, 1a-noroeste litoral y 1b-noroeste interior (Alía *et al.*, 1996). La primera, distribuida por cotas bajas de las provincias costeras, muestra unas características excelentes de crecimiento y ramosidad, con árboles de excelente poda natural y corteza fina, aunque con cierta tendencia a la curvatura (Alía *et al.*, 1995; Molina, 1965). Esta procedencia se encuadra dentro del grupo atlántico, compartiendo origen genético con las poblaciones atlánticas de Portugal y Francia, y muestra una escasa diversidad

genética (Bucci *et al.*, 2007). En la zona interior, el origen y caracterización de las masas de *P. pinaster* es más complejo. Las masivas repoblaciones realizadas a lo largo del siglo XX con semilla foránea, probablemente de la meseta castellana, ha resultado en unas masas de comportamiento muy variable y baja calidad productiva. En general, las masas del interior de Galicia muestran una ramosidad mucho más elevada, menor crecimiento en altura y menor esbeltez, una pobre conformación del fuste y mayor espesor de corteza.

Junto con *P. radiata* y *Eucalyptus globulus*, el pino marítimo es la especie más utilizada en repoblación en Galicia, con un ritmo de plantación anual variable entre aproximadamente 3000 y 6000 ha anuales, dependiendo de la existencia de subvenciones públicas (Álvarez *et al.*, 2001; Álvarez *et al.*, 2005). Para alcanzar este ritmo de plantación, los viveros gallegos producen anualmente entre 4 y 10 millones de plantas de *P. pinaster* (Figura 1), siendo necesarios alrededor de 2000 kg de semilla para cubrir esta producción.




Figura 1. Producción de planta de *Pinus pinaster* en los viveros gallegos vendida para uso en repoblación. Adaptado de Álvarez *et al.* (2001; 2005).

Actualmente la producción anual de madera en rollo de *P. pinaster* en Galicia se estima en torno a 1,9 millones de m³ (Sanz *et al*, 2006). Sin embargo la mayoría de la madera que se corta en esta Comunidad es madera de baja calidad destinada a la industria de trituración. Sólo un 2% de la madera maciza utilizada en la industria del aserrado es de origen Gallego, y ésta es utilizada en su mayoría para obtener productos de bajo valor añadido como tabla y tablón para encofrados. Un aumento de calidad en nuestras masas permitiría la utilización de la madera aserrada para otros destinos como el sector de la construcción, mobiliario, carpintería así como para producción de tarima, frisos y otros productos cepillados, tal como ocurre en el mercado de Francia y Portugal.

El potencial productivo y económico de las explotaciones de *P. pinaster*, junto con la importante demanda de semilla, impulsaron en los años 80 el desarrollo en Galicia de un programa de mejora genética cuyo fin último es el abastecimiento de semilla de alta calidad genética para su uso en repoblación.

II. El programa de mejora en Galicia-Costa

Las actividades de mejora de *P. pinaster* en Galicia se remontan a los años 50, cuando bajo la dirección de Fernando Molina se instaló el primer ensayo de procedencias de la especie en la provincia de Pontevedra, evaluando el comportamiento en crecimiento, ramosidad y forma del fuste de 24 procedencias, incluyendo procedencias locales, nacionales y de Francia y Portugal. Los resultados a los 10 años de edad revelaron el comportamiento superior de la procedencia local (As Neves, Pontevedra) en cuanto a crecimiento, esbeltez y escasa ramosidad (Molina, 1965).

Ante la incesante demanda de semilla y a raíz de los resultados anteriores, en los años 80 comenzaron las actuaciones de mejora propiamente dichas sobre la procedencia local de Galicia-Costa, entendida ésta como la franja costera desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altitud (Vega *et al*, 1993). El programa se planteó como un programa de mejora clásico por selección recurrente y mejora paulatina de caracteres deseables (ver Figura 2).




Figura 2. Esquema del programa de mejora de *Pinus pinaster* en Galicia-Costa.

Población de mejora, población de producción y dispositivo experimental

En los años 1986-88 se preseleccionaron fenotípicamente 180 árboles superiores, de los que finalmente 128 fueron seleccionados por sus buenas características de crecimiento, espesor de la corteza, ramosidad y rectitud del fuste. De los árboles seleccionados se recogieron púas para la clonación por injerto y piñas para el establecimiento de los correspondientes ensayos de progenie que servirán para estudiar la superioridad de los parentales, para estimar los parámetros genéticos y como base para seleccionar la nueva población de mejora de segunda generación.

116 de los 128 árboles seleccionados se clonaron con éxito estableciéndose en 1991 el primer huerto semillero clonal en Sergude (A Coruña), con 10 ramets de cada clon en un diseño de bloques completos al azar restringido, evitando al máximo la proximidad de ramets del mismo clon. Este huerto semillero, certificado en 2001 como material de base para la obtención de material forestal de reproducción de la categoría cualificado (BOE nº 23, 26-01-2001), comenzó a producir semilla en 1995, estabilizándose la producción alrededor del año 2000 (Figura 3).

En 1998 se instaló el segundo huerto semillero de esta especie en Monfero (A Coruña) con el mismo material y diseño representado en el huerto de Sergude. Fue registrado en 2007 en el Rexistro Galego de Materiais de Base (DOG nº 77, 20-04-2007) y ha entrado en producción en los últimos años, aunque con una escasa producción de semilla debido a una evidente peor calidad de estación.

Finalmente, en 2008 se ha instalado un huerto semillero depurado o de generación




Figura 3. Evolución de la producción de semilla en el Huerto semillero de Sergude en el período 1998-2005.

1.5 donde están representados únicamente aquellos genotipos cuya descendencia se ha mostrado superior en los ensayos de progenie. El huerto, situado en A Braxe (A Coruña), ha sido propuesto para su catalogación como material controlado (Zas *et al.* 2008b).

En paralelo a la instalación de los huertos semilleros se establecieron los correspondientes ensayos de progenie, todos ellos con familias de polinización abierta. Con las primeras recogidas de material, en 1991 se instalaron dos ensayos provisionales en Brión y Rois (A Coruña) con 24 y 32 familias respectivamente. En 1994-95 se instaló una serie más completa de 5 ensayos de progenie con entre 78 y 111 familias distribuidos por la zona costera gallega, completada con 3 ensayos en el interior de Galicia establecidos en el año 2000. Finalmente en el año 2005, se estableció la última colección con todas las 116 familias en 7 ensayos de progenie establecidos en un gradiente costa – interior. La distribución de los distintos ensayos de progenie, huertos semilleros y árboles plus se presenta en la Figura 4.

Tabla 1. Estimaciones de la heredabilidad individual (h_i^2) y familiar (h_f^2) para distintos caracteres y edades en la población de mejora de *Pinus pinaster* en Galicia-Costa.

Carácter	Edad	h_i^2	h_f^2	Referencia
Crecimiento				
Altura	Invernadero	0.16	0.72	1
	Vivero	0.48	0.96	2
	3	0.23-0.34	0.77-0.84	3*
	5	0.13-0.22	0.56-0.68	4
	8	0.17-0.33	0.65-0.78	5*
Diámetro	Invernadero	0.20	0.72	1
	3	0.11-0.13	0.66-0.71	3*
	8	0.10-0.17	0.49-0.62	5*
Biomasa total	Invernadero	0.15	0.50	1
Forma del fuste y ramosidad				
Rectitud del fuste	8	0.05-0.15	0.32-0.61	5*
Policiclismo	8	0.36-0.36	0.78-0.79	5*
Ángulo de inserción de ramas	8	0.11-0.35	0.52-0.79	5*
Longitud del entrenudo	8	0.21-0.27	0.67-0.74	6
Número de ramas	8	0.04-0.10	0.26-0.47	6
	Invernadero	0.14	0.49	1
Susceptibilidad a enfermedades y plagas				
<i>Hylobius abietis</i>	1	0.11-0.23	0.64-0.80	7
<i>Armillaria ostoyae</i>	3	0.08	0.35	8*
<i>Fusarium oxysporum</i>	2-3	0.10-0.13	0.53-0.73	9*

Referencias 1: (Zas y Fernández-López, 2005), 2: (Zas et al, 2005a), 3: (Martíns 2007), 4: Zas, no publicado, 5: (Zas, 2006b), 6: (Zas et al, 2004a), 7: (Zas et al, 2005b), 8: (Zas et al, 2007b), 9: (Martíns et al, 2008).

altura, el policiclismo, la longitud media del entrenudo y el ángulo de inserción de ramas muestran heredabilidades individuales moderadas y son susceptibles de mejora por selección recurrente (Zas *et al.*, 2004a). Otros caracteres como la rectitud, inclinación, bifurcación, crecimiento diametral y número y tamaño de ramas muestran heredabilidades familiares moderadas. La eliminación de los peores parentales del huerto basándose en el comportamiento de sus progenies generará, por tanto, un aumento en la ganancia genética esperada (Zas *et al.*, 2004a).

Interacción genotipo x ambiente

De la evaluación de estos últimos ensayos también se desprende una importante interacción genotipo x ambiente (GxE) en la mayoría de los caracteres evaluados, con un comportamiento familiar relativo especialmente sensible a la variación ambiental. Aunque los cuatro ensayos de progenie se sitúan sobre la zona costera de Galicia y no muestran unas diferencias ambientales excesivamente patentes, el comportamiento relativo del material de mejora varió substancialmente de ensayo a ensayo. En ciertos caracteres como el

si bien su objetivo fundamental es estudiar la viabilidad del material genético costero en la zona interior de Galicia (ver apartado III más adelante). Esta nueva colección se presenta como un excelente dispositivo experimental para perfilar el grado de control genético de la rectitud, minimizando al máximo las causas externas que acentúan la susceptibilidad a la inclinación por falta de anclaje.

Heterogeneidad espacial

En los ensayos de progenie originales se ha observado una elevada heterogeneidad espacial a pequeña escala que condiciona el uso de las técnicas de estadística convencional (Zas, 2006a, b, 2008; Zas *et al.*, 2007). Este problema, frecuente en ensayos de agronomía y ecología, es especialmente relevante en los ensayos genéticos forestales, cuyo elevado tamaño dificulta la subdivisión en bloques ambientalmente homogéneos. En el caso concreto de los ensayos de progenie de *P. pinaster* establecidos en Galicia, la irregularidad topográfica y edáfica de los terrenos de los sitios de ensayo y el elevado tamaño de los mismos, consecuencia inevitable del gran número de familias testadas y el amplio marco de plantación utilizado (3×2 ó 3×3 m), conlleva bloques internamente heterogéneos y a una fuerte autocorrelación espacial en la mayoría de las variables estudiadas (Zas *et al.*, 2008). En estas condiciones, los diseños experimentales convencionales, como el diseño de bloques completos al azar (BCA) o incluso los diseños de bloques incompletos (BI), pueden resultar insuficientes para absorber la variación ambiental a pequeña escala (de la Mata *et al.*, 2008a, b). En particular, en los ensayos de progenie de 1994-95, establecidos bajo un diseño de BCA con unidades experimentales de 5 plantas contiguas, el análisis convencional de distintas variables espacialmente autocorrelacionadas resultó

claramente ineficiente, siendo necesario recurrir a técnicas de análisis espacial para su correcto análisis (Zas, 2006b). Las estimaciones de los componentes de la varianza, heredabilidad y valores de mejora, así como la precisión de estas estimaciones resultó substancialmente diferente cuando se consideraba la autocorrelación espacial en los análisis, quedando patente la necesidad del uso de técnicas de ajuste, hoy en día disponibles en la mayoría de paquetes estadísticos (Zas, 2006b). Como se describe más adelante, la estructura espacial de las variables dependientes también afectó de forma notable a los procesos de selección en los ensayos de progenie de cara a su conversión en huertos semilleros de brinzales (Zas, 2008b).

Como consecuencia de todos estos estudios, la nueva colección de ensayos de progenie establecida en 2005 y a la que nos referiremos en el apartado III, se estableció con un diseño de bloques incompletos resoluble, donde al reducir el tamaño de los bloques se mejora de forma notable la eficiencia del diseño experimental (de la Mata *et al.*, 2008a, b).

Correlación juvenil-adulto

Como en todo programa de mejora genética de especies arbóreas, el mayor impedimento operativo es el excesivo tiempo necesario para una evaluación fidedigna del material. El fin último de un programa de mejora es siempre mejorar determinadas características de interés a la edad de turno y, en este sentido, las evaluaciones debieran retrasarse hasta este momento. Al manejar especies arbóreas, donde el período de rotación es de varias décadas, los procesos de evaluación y selección se adelantan a edades más tempranas, donde, alcanzada la fase de madurez ontogénica, la correlación con el comportamiento a la edad del turno es suficientemente razonable. En el caso de *P. pinaster*, y según los trabajos realizados en

de Sergude se han vuelto muy importantes y difíciles de controlar (Merlo *et al*, 2005a). Posteriormente la detección del hongo *Fusarium circinatum* Neirenberg & O'Donnell, ha ocasionado la cuarentena del mismo como fuente de material forestal de reproducción.

Selección, mejora y ganancia genética

A partir del dispositivo existente y en función de los resultados obtenidos se están llevando a cabo dos tipos de selección que buscan aumentar la ganancia acumulada. Los dos tipos de selección utilizados, a los que nos referiremos más adelante, son la selección hacia atrás de los parentales de la población inicial (*Backward selection*) y la selección hacia delante sobre las progenies de dicha población inicial (*Fordward selection*). Estas selecciones conducirán a una ganancia en la población de mejora y en la de producción, que habrá que sumar a la ganancia generada por la selección inicial de los árboles plus originales.

La superioridad del material de primera generación ha sido ampliamente demostrada tanto en ensayos en vivero (López-Rodríguez, 2006; Zas *et al*, 2005a) como en invernadero (Zas y Fernández-López, 2005) y en evaluaciones tempranas de distintas colecciones de ensayos (Martíns *et al*, 2008b; Vega *et al*, 1997). En la Figura 5 se muestra la superioridad del material de mejora respecto a los testigos comerciales, con ganancias que varían entre el 3 y el 17%, llegando a alrededor del 30% en las evaluaciones de los primeros ensayos provisionales de Rois y Brión (Vega *et al*, 1997).

Backward selection o selección hacia atrás de parentales

Tras las evaluaciones de los ensayos de progenie ha sido posible conocer el valor de mejora de cada uno de los genotipos. Este valor lo define la superioridad de su descendencia respecto a la media (aptitud

general combinatoria) y en función de ella se propone una selección de parentales con dos objetivos: eliminar los peores genotipos de los huertos semilleros para conseguir una ganancia sobre el material forestal de reproducción y seleccionar una población élite que cruzaremos de manera controlada para obtener nuevo material élite de segunda generación.

Para depurar los huertos semilleros y obtener una semilla de mayor valor genético, se ha propuesto eliminar los parentales considerando la rectitud y longitud del entrenudo (caracteres con heredabilidad familiar de 0.53 y 0.80 respectivamente). Así, se han seleccionado 78 genotipos de los 116 existentes en los huertos. La depuración se aplicó al nuevo huerto *depurado* instalado en 2008 (Tabla 2) propuesto para su catalogación como material de base *controlado*. Los huertos semilleros originales (Sergude y Monfero) serán reservados como bancos de germoplasma y se mantendrán con todos los genotipos. Para conseguir una ganancia en la calidad de la semilla de estos huertos, se propone recoger la piña de manera selectiva sobre los 78 genotipos superiores. Este método se trata de un método de selección materna que genera ganancias significativas (2-6%) respecto al lote completo del huerto (Merlo *et al*, 2005b).

Por otro lado, se han seleccionado 8 parentales élite cuya descendencia mostró excelente rectitud en todas las parcelas, ausencia de bifurcación, baja ramosidad, y entrenudos largos. Estos genotipos, con una escasa diversidad pero alto nivel de ganancia, se han cruzado entre sí mediante polinización controlada para obtener familias de hermanos completos. La inclusión de nuevos parentales y la realización de nuevos cruzamientos permitirá obtener una base genética suficiente para conseguir una población élite con grandes niveles de ganancia.

Tabla 2. Población de producción de semilla actual y prevista en el programa de mejora de Galicia-Costa.

Material	Selección	Sup. (ha)	Producción (Kg)	Instalación	Inicio de la producción de semilla
<i>Huerto semillero clonal de Sergude (A Coruña)</i>					
116 árboles plus seleccionados por crecimiento, forma y ramosidad en masas naturales de Galicia-Costa. Recogida selectiva sobre los 78 clones superiores (selección materna).		3.5	200-250	1991	1995
<i>Huerto semillero clonal de Monfero (A Coruña)</i>					
116 árboles plus seleccionados por crecimiento, forma y ramosidad en masas naturales de Galicia-Costa. Recogida selectiva sobre los 78 clones superiores (selección materna) o eliminación de los clones descartados.		3.5	150-200	1997	2004
<i>Huerto semillero clonal de A Braxe (A Coruña)</i>					
78 los 116 clones originales seleccionados mediante selección familiar (33%) en función de caracteres de rectitud y crecimiento.		10	300-350	2008	2011
<i>Huertos semilleros de brinzales en AsNeves, Cortegada y Lalín (Pontevedra, Ourense)</i>					
Ensayos de progenie aclarados genéticamente mediante selección combinada (30%) por crecimiento utilizando técnicas de análisis espacial.		15	500-600	1995 (aclarado en 2009-10?)	2008
<i>Huerto semillero de 2ª generación</i>					
150 Individuos superiores seleccionados en los ensayos de progenie de primera generación mediante selección individual basada en calidad de madera + selección familiar por rectitud y crecimiento.		5	300-350	?	?

selección familiar + intrafamiliar (F+WFS) en otros (Zas, 2008b). Las ganancias en estos huertos de brinzales, cuya superficie total se acercaría a las 15 ha, se estiman entre el 3.3 y el 7.5% en relación a la semilla de los huertos de primera generación.

Como material de mejora de segunda generación, para continuar el ciclo de mejora, está prevista la selección de 50-100 árboles superiores en cada uno de los tres ensayos de progenie remanentes de la colección de 1994-95 utilizando índices de selección que consideren caracteres de crecimiento, ramosidad, y calidad de

madera, así como la información familiar en relación a la rectitud obtenida en la nueva colección de ensayos de 2005. Dichos genotipos serán clonados para crear los nuevos huertos clonales de segunda generación. Asimismo, se obtendrá semilla para establecer los correspondientes ensayos de progenie, iniciando de nuevo el ciclo de selección recurrente. También se contempla la posibilidad de establecer cruzamientos controlados entre los mejores individuos con el fin de aprovechar no solo la variación genética aditiva sino también la aptitud específica combinatoria en todos los caracteres anteriores.

embargo, como ya se ha comentado, sólo un escaso porcentaje de familias especialmente sensibles a la variación ambiental contribuyó significativamente a la interacción, y es esperable que determinadas familias estables puedan ser utilizadas como material forestal de reproducción o como material de mejora en la zona interior.

Hibridaciones interprocedencia

Durante los últimos años se ha iniciado una línea de creación de híbridos interprocedencia de *P. pinaster*. El objetivo de esta línea de estudio es encontrar una combinación híbrida entre el material de mejora Galicia-costa y otras procedencias de la misma especie, que permita ampliar el rango de utilización y conseguir mayor estabilidad de comportamiento frente a distintas calidades de estación. Se han obtenido variedades híbridas mediante el cruzamiento de Galicia Costa con las procedencias Soria-Burgos, Cuenca, Córcega, Landas y Galicia interior. La evaluación del comportamiento de estos materiales híbridos en las condiciones climáticas de Galicia interior, servirá para determinar una posible vía de desarrollo de un programa de mejora en esta zona.

La polinización controlada para la obtención de estos híbridos se desarrolló con éxito en 2004 aunque se observó una incompatibilidad al cruzamiento muy alta entre aquellas procedencias más distantes y especialmente entre Galicia-Costa y Cuenca. La capacidad germinativa y el desarrollo inicial de las plántulas muestra, a su vez, diferencias significativas, esbozando a este nivel ciertas apariencias de vigor híbrido en crecimiento para las procedencias híbridas de Galicia-Costa × Córcega y Galicia-Costa × Landas (de la Mata *et al*, en preparación)

La incompatibilidad de cruzamiento,

posiblemente debida a una incompatibilidad genética y fisiológica (de la Mata *et al*, 2006), ha provocado que se consiga muy poco material y ha hecho necesario la amplificación del mismo mediante clonación. Para ello, se ha puesto a punto la técnica de estaquillado juvenil en cascada de plántulas jóvenes de este material híbrido de *pinaster*, alcanzándose un 85% de porcentaje de enraizado (Varela, 2007). Un estudio del sistema radical de estas estaquillas ha permitido apreciar diferencias significativas en el desarrollo del sistema radical de las poblaciones sintéticas respecto a la población natural.

Uno de los objetivos de esta línea es probar la adaptación a la sequía de las poblaciones híbridas creadas, frente a las naturales de Galicia, intentando combinar el crecimiento, la rectitud y la adaptación a condiciones extremas. Los resultados preliminares de un ensayo de sequía muestran que, en condiciones de sequía, el ritmo de crecimiento de ciertas procedencias híbridas es semejante al de las poblaciones naturales con riego continuo (de la Mata *et al*, en preparación). En el año 2007 se instalaron en campo 3 ensayos con dicho material clonal híbrido, para continuar con la evaluación del mismo en condiciones reales de uso (Figura 4).

IV. Nuevas líneas de actuación

En paralelo a los trabajos clásicos del programa de mejora, se están abriendo nuevas líneas de estudio para obtener una mejor caracterización del material de mejora intentando buscar explicación a ciertas circunstancias observadas en los ensayos de campo y poniendo a punto técnicas que van a permitir incorporar nuevos parámetros de selección en el programa de mejora de esta especie tanto en costa como en interior.

detalle con el fin de evitar un aumento del riesgo fitosanitario al avanzar en el programa de mejora. Aunque los resultados al respecto son todavía provisionales, la importante variación genética observada facilitará la inclusión de criterios de resistencia a enfermedades y plagas en los procesos de selección del programa.

Calidad de madera

Dada la baja calidad de madera existente en nuestras masas y la relación desfavorable entre ésta y el crecimiento en *P. pinaster* (Pot *et al*, 2002), se considera necesario incluir parámetros de calidad de madera en el programa de mejora de esta especie en Galicia, según se recomienda para las principales especies de crecimiento rápido en Europa (Rozenberg *et al*, 2001).

En el caso de *P. pinaster*, los parámetros que más van a afectar a la calidad del producto final son, junto con la rectitud de fuste y la ramificación, la homogeneidad de densidad de madera y la rigidez (Pot *et al*, 2002). Está previsto medir dichos parámetros en la serie de ensayos de progenie instalados en 1994-1995 sobre aquellas familias previamente seleccionadas por crecimiento. Para la medición se

utilizarán diferentes métodos no destructivos (microdensitometría de rayos X, resistógrafo, martillo sónico) que se están poniendo a punto actualmente para otras especies en el CIS Madera .

Agradecimientos

El programa de mejora de *P. pinaster* en Galicia se ha desarrollado bajo múltiples fuentes de financiación, entre las que destacan las distintas propuestas del Plan de Mejora de Galicia y los proyectos INIA RTA2-109 e INIA RTA5-173 más recientes. En el programa han participado multitud de personas del Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán, desde Guillermo Vega y Josefa Fernández López en la dirección, hasta Ricardo Ferradás, Mariano Arnedo, José Vázquez y Jose María Mendaña en los viveros. Pero éstos no son sino unos pocos ejemplos de todas las personas que en alguna medida han colaborado en el programa y cuya ayuda es preciso agradecer. Citar aquí todos los nombres del personal investigador, de laboratorio y de campo que han participado en el programa alargaría en exceso este apartado.

- Kleinhentz, M.; Raffin, A.; Jactel, H. 1998. Genetic parameters and gain expected from direct selection for resistance to *Dioryctria sylvestrella* Ratz. (Lepidoptera: Pyralidae) in *Pinus pinaster* Ait., using a full diallel mating design. *Forest Genetics* 5(3): 147-154.
- Kremer, A.; Lascoux, D.M. 1988. Genetic architecture of height growth in maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.). *Silvae Genetica* 37(1): 1-8.
- Landeras, E., García, P., Fernández, Y., Braña, M. 2005. Outbreak of pitch canker caused by *Fusarium circinatum* on *Pinus* spp. in Northern Spain. *Plant Disease* 89: 1015.
- Lario, F.J.; Ocaña, L. 2004. Base mecánica de la inestabilidad de *Pinus pinaster* Ait. en las plantaciones juveniles de climas atlánticos. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales* 17: 175-180.
- López-Rodríguez, C.A. 2006. Evaluación en vivero de familias de polinización abierta de *Pinus pinaster* Ait. y correlación con su comportamiento adulto en campo. Proyecto Fin de Carrera, EPS Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo, 85 p.
- Martíns, P.; Moreira, X.; Zas, R.; Sampedro, L.; Solla, A. 2008a. Variación genética y efecto de la fertilización en la susceptibilidad de *Pinus pinaster* a *Fusarium oxysporum*. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales* 26: 97-102.
- Martíns, P.; Zas, R.; Sampedro, L. 2008b. Plasticidad fenotípica de *Pinus pinaster* frente a la disponibilidad de nutrientes. *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales* 24: 67-75.
- Merlo, E.; Fernández-López, J. 2004. Análisis del balance parental reproductivo en un huerto semillero de *Pinus pinaster*. *Investigación Agraria. Sistemas y Recursos Forestales* 13(2): 387-398.
- Merlo, E.; Teiga, J.A.; Lombardero, M.J.; Fernández-López, J. 2005a. Perforadores de piñas asociados a un huerto semillero de *Pinus pinaster*: repercusión en la cosecha. En: IV Congreso Forestal Español, Zaragoza.
- Merlo, E.; Zas, R.; Fernández-López, J. 2005b. Ganancia obtenida mediante recogida selectiva de semilla en un huerto semillero de *Pinus pinaster* Ait. En: IV Congreso Forestal Nacional, Zaragoza.
- Molina, F. 1965. Comportamiento racial de *Pinus pinaster* en el noroeste de España. *Anales IFIE* 2(10): 221-238.
- Moreira, X.; Ramos, M.; Sampedro, L.; Zas, R.; Solla, A. 2008a. Densidad y disposición de canales resiníferos en *Pinus pinaster* ante tratamientos de fertilización y el ataque de *Hylobius abietis* (Coleoptera: Curculionidae). *Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales* 26: 45-50.
- Moreira, X., Sampedro, L., Zas, R., Solla, A. 2008b. Alterations of the resin canal system of *Pinus pinaster* seedlings alter fertilization of a healthy and of a *Hylobius abietis* attacked stand. *Trees* 22: 771-777.
- Pot, D.; Chantre, G.; Rozenberg, P.; Rodrigues, J.C.; Jones, G.L.; Pereira, H.; Hannrup, B.; Cahalan, C.M.; Plomion, C. 2002. Genetic control of pulp and timber properties in maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.). *Annals of Forest Science* 59(5-6): 563-575.
- Rodríguez-Morales, B. 2008. Compuestos fenólicos como mecanismo de defensa constitutivo e inducido mediante metil jasmonato en juveniles de *Pinus pinaster*. Proyecto Fin de Carrera. EPS Lugo. Universidad de Santiago.
- Rozenberg, P.; Franc, A.; Cahalan, C. 2001. Incorporating wood density in breeding programs for softwoods in Europe: a strategy and associated methods. *Silvae Genetica* 50: 1-7.

- Zas, R.; Merlo, E.; Fernández-López, J. 2004b. Genotype x environment interaction in Maritime pine families in Galicia, Northwest Spain. *Silvae Genetica* 53(4): 175-182.
- Zas, R.; Merlo, E.; Fernández-López, J. 2004c. Juvenile - mature genetic correlation in *Pinus pinaster* Ait. under different nutrient x water regimes. *Silvae Genetica* 53(3): 124-129.
- Zas, R.; Merlo, E.; López-Rodríguez, C.A.; Fernández-López, J. 2005a. Evaluación en vivero de familias de *Pinus pinaster* y correlación con su comportamiento adulto en campo. En: IV Congreso Forestal Español, Zaragoza.
- Zas, R.; Merlo, E.; Sampedro, L. 2008. Primer huerto semillero depurado de *Pinus pinaster* en Galicia. Informe Técnico LOU08-001. Lourizán, Pontevedra.
- Zas, R.; Sampedro, L.; Prada, E.; Fernández-López, J. 2005b. Genetic variation of *Pinus pinaster* Ait. seedlings in susceptibility to *Hylobius abietis* L. *Annals of Forest Science* 62(7): 681-688.
- Zas, R.; Sampedro, L.; Prada, E.; Lombardero, M.J.; Fernández-López, J. 2006. Fertilization increases *Hylobius abietis* L. damage in *Pinus pinaster* Ait. seedlings. *Forest Ecology and Management* 222(1-3): 137-144.
- Zas, R.; Solla, A.; Sampedro, L. 2007. Variography and kriging allow screening *Pinus pinaster* resistant to *Armillaria ostoyae* in field conditions. *Forestry* 80(2): 201-209.